

Captive bred Phelsuma

Phelsuma barbouri

Loveridge, 1942

1942 *Phelsuma barbouri* Loveridge, Bull. Mus. Comp.Zool., Cambridge, Mass., 89: 458.

Typlokal: Ett område mellan Tamatave och Tananarive, men där kan den inte längre hittas. Idag förekommer den på berget Ambohimirandrana. Där lever den på mellan 2000-2300 meters höjd. Berget ligger på centrala Madagascar.



Förekomst: *Phelsuma barbouri* är som ovan nämnts en art som endast lever på mycket höga höjder. Träd och buskar förekommer inte på de höjderna, vilket gör arten till helt marklevande och den lever sitt liv bland de kala klipporna. Där använder de klippskrevor både som skydd och ägglägningsplatser. Klimatet på dessa höjder är kärvt med kalla och fuktiga nätter. Medeltemperaturen den kallaste månaden ligger på ca: 10°C, och den varmaste månaden på ca: 17°C. Den genomsnittliga nederbörden per år är 1675 mm. Området har också två till tre utpräglade torrånader under vintern. Under kalla nätter är nattfrost inte helt ovanligt. Solstrålningen är synnerligen stark, och hänsyn till det måste tas för att framgångsrikt kunna hålla arten i terrarier. Vid ett besök på Madagascar (april, 2000) av undertecknad hittades 3 *P.barbouri* även 6 km. norr om Tananarivo på 1300 m, men dessa individer var troligtvis rymmlingar från en närliggande reptilexportör.

Utseende: Både hanar och honor blir ungefär lika stora, och når maximalt ca: 15 cm. Grundfärgen är metallisk grön, men kan på olika individer och genom olika sinnesstämningar variera till metaliskt blå. På huvudet går ett mönster av tunna bruna linjer som börjar vid nosen och breder ut sig bakåt huvudet. Längs ryggens sidor går två breda bruna band, som kan vara mer eller mindre upplösta. Dessa slutar vid svansroten. Från ögats bakkant och längs sidolinjen går även här ett brett brunt band, som varierar i tydlighet. Över och underläppar är helt vita, och undersidan är grå blå. Variationen mellan individer kan vara stor, från helt marmorerade individer till de med mycket tydliga och markerade bruna linjer. Ungarna ser ut som små kopior av de vuxna djuren.

Skötsel: Precis som hos de flesta daggeckos så bör man hålla *P.barbouri* parvis. Då arten är marklevande är ett terrarium med måtten 50X60X50 lämpligt för ett par. Inredningen bör bestå av ett bottenstrat av sand. De ofta så använda bamburören kan man utelämna och i stället använda stenar som huvudsaklig inredning. Varva dessa med en sansiveria och ett par grenar (se bild). Ventilationen bör vara mycket mer tilltagen än hos övriga arter, och lämpligt är att hela taket täcks med nät. Även belysningen bör vara kraftigare. Själv så använder jag tre lysrör över mina *P.barbouri* terrarium, istället för som hos övriga arter, två st. En halogenspott placeras på lämpligt ställe för att ge djuren möjlighet att värma upp sig, samt för att underlätta matsmältning under de kallare perioderna. Temperaturen sommartid bör nå upp till 24°C dagtid, och kan nattetid få sjunka till 18°C. Vintertid är en dagtemperatur på 16°C lämplig, och nattetid 13°C. Lysrören är på 14 timmar per dag under perioden mars-october.



Captive bred Phelsuma



Under vintern (november-februari), räcker det med 10 timmar. Halogenspotten är på mellan kl. 11-14 varje dag året om. Den relativa fuktigheten bör ligga mellan 50-85%. Arten hör till ägglimmarna, och normalt så lägger en hona 6-10 ägg per säsong. Äggen limmas oftast på bladen av Sansiverian, men ibland även i skrevor mellan stenarna eller på glaset. Vid en kläcktemperatur som varierar från 31,5°C dagtid till 24°C nattetid, kläcks äggen efter 65-70 dagar. Ungarna mäter vid kläckning 32-35 mm. Ungarna bör placeras en och en i små terrarier. Mycket viktigt är att ungarna de första veckorna får fri tillgång på foder. De verkar vara mycket känsliga de första två veckorna, men är efter den perioden relativt problemfria. De når vuxen storlek vid 8-10 månaders ålder. Könsmogna blir de efter 15-20 månader.