

# Captive bred Phelsuma

## Phelsuma borbonica (agalegae) mater

Meier 1995

1995 *Phelsuma borbonica (agalegae) mater* Meier, Salamandra, Rheinbach, 31 (1): 35, Abb.4-5.

**Typlokal:** Basse Vallée, Reunion.

**Förekomst.** Arten är endast känd från ett litet område på över 700 meters höjd. Där lever den på gränsen till primärregnskogen. På grund av den extremt höga luftfuktigheten frodas mossor och orchideér i mängd. Temperaturer och luftfuktighet i området påminner mycket om värdena för nominatformen *P.borbonica borbonica*.

**Usteende.** Hanarna når en totallängd av 160 mm, och honorna ca: 135 mm. Grundfärgen är metallic blå med klarröda fläckar. Fläckarna är oftast något större än hos nominatformen. Även här bildar de mer eller mindre regelbundna tvärband på svansen. Hos de vuxna djuren är huvudet och halsen klart gulbrunt. Bakbenen är även de blå med stora röda fläckar. Frambenen är precis som huvud och hals gulbruna. Ringen runt ögonen är blå. Kroppens undersida är oftast något mörkare än hos nominatformen, och varierar mellan smutsvit till gråbrun. Färgen hos ungarna är oftast lite kraftigare än hos *P.borbonica borbonica*. De längsgående fälten är mer mot det blågröna än rent gröna, fläckarna lite kraftigare brunröda.



**Skötsel.** Även den här arten är definitivt inget för nybörjaren. Terrariet bör mäta 50cmX50cmX80cm, och vara rikligt planterat. Viktigt är också att man placerar det så att man har möjlighet att erbjuda djuren de kalla och fuktiga nätter arten kräver. Lämplig temperatur och fuktighet ( se *P.borbonica borbonica*). Precis som hos nominatformen kan man hålla djuren i små grupper om en hane och 3-4 honor. Arten är ägglimmare och de första äggen läggs oftast i början på April. Äggen kläcks efter ca: 90 dagar, och ungarna mäter vid kläckning 45-47 mm. I ett litet terrarium med rikligt med gömmställen, kan man hålla 2-4 ungar tillsammans. Ungarna bör duschas två gånger per dag för att undvika uttorkning, på grund av för torr luft. Vuxen storlek når de efter 10-12 månader, men det vuxna djurets färger och det gula huvudet framträder inte förrän vid ca: två års ålder. Även den här arten bibehåller i F2 och F3 generation, de vilda individernas klara färger. Etablering av avelsgrupper bör vänta tills det att ungarna blivit ett och ett halvt till två år. Var noga med att observera eventuella aggressioner mellan djuren.

En dag gamla ungar av *Phelsuma borbonica (agalegae) mater*.