

# Captive bred Phelsuma

## Phelsuma dubia

Boettger 1881

1881 *Pachydactylus dubius* Boettger, Zool. Anz. Leipzig, 4:46.

1883 *Phelsuma dubium* Boettger, Kat. Rept. Mus. Senckenb., Frankfurt/M., 38.

1942 *Phelsuma dubia dubia* Loveridge, Bull. Mus. Comp. Zool., Cambridge, Mass., 89: 461.

1966 *Phelsuma dubia* Mertens, Senckenb. Biol., Frankfurt/M., 47 (2): 101.

**Typlokal:** Majunga (Mahajanga), nord-västra Madagascar.

**Förekomst:** Arten är en av de mest utbredda av alla *Phelsuma* arter. Den förekommer längs hela västra Madagascar. Även samtliga öar i ögruppen Comorena tillhör utbredningsområdet. Vidare så förekommer den på ön Zansibar utanför Tanzania, samt på Tanzanias fastland. Under senare år har den även påträffats på ön St Marie (P.schönneker 2001), utanför Madagascars nord öst kust. Den förekommer i mycket skiftande miljöer, och även i och runt mänsklig bebyggelse. Klimatet i utbredningsområdet är generellt fuktigt och varmt.

**Utseende:** Arten hör inte till de mest färgsprakande av släktets arter. Grundfärgen är oftast brun-grön, men varierar från helt brun till mer eller mindre grön. Ryggen är täckt av små röda fläckar som även de varierar i intensitet, mellan rött till brunrött. Från nosen till ögat går alltid en brunröd linje. Ögats iris är klarröd. En svag längslinje från frambenen till bakbenen är alltid synlig. Undersidan är gråvit. Hanarna når en längd av 16 cm, medans honorna sällan överstiger 14 cm. Kroppen på ungarna är brungrå med små klarblå prickar, och svansen har en karakteristisk gul färg.

**Skötsel:** *Phelsuma dubia* hör helt klart till de allra lättaste arterna att hålla i terrarier, och är en idealisk art att börja sin bekantskap med. Arten hålls lämpligast parvis, då även honorna är mycket aggresiva mot varandra. Då den hör till de medelstora arterna bör terrariet hålla



© 1999 M. Forsberg

måtten 40X40X60 cm. Inredningen ska som hos övriga arter bestå av ett bottensubstrat som barkmull, myckert levande växter och bamburör av lämplig diameter. Temperaturen dagtid bör som max nå upp till 30°C och kan nattetid få sjunka till runt 20°C. Den relativa fuktigheten kan få variera mellan 40-70%. Arten är ganska tolerant både vad gäller temperatur och fuktighet. *P.dubia* hör till de ägglimmande arterna och en hona lägger normalt 12-18 ägg på en säsong. Äggen limmas oftast i

bamburören två och två. Vid en kläckningstemperatur på 28°C, kläcks de efter ca: 40 dagar. Ungarna mäter vid kläckning 37-42 mm, och hålle slämpligast en och en i små terrarier. Trots den kanske inte så intensiva färgteckningen så är detta en art jag varmt kan rekommendera som en idealisk nybörjar art (kanske den allra bästa).