

Captive bred Phelsuma

Phelsuma flavigularis

Mertens 1962

1962 *Phelsuma flavigularis* Mertens
Senckenb. biol., Frankfurt/M.,
43(2): 94, Sid 8, Fig. 4,5.

Typlokal: Perinet (Andasibe), Öst-Madagascar.

Förekomst: Arten förekommer bara på typlokalen, dvs. i Perinet området på östra Madagascar. Här lever den på 950-1150 meters höjd företrädesvis på *Ravanela* palmer. Enligt Pronk så förekommer arten även i ett område norr om Taolanaro på sydöstra Madagascar. I området kring Perinet hittar man även *P.lineata lineata* och *Phelsuma quad. quadriocellata* samt *P.mad.boehmei*. Medeltemperaturen på årsbasis varierar i området, från den kallaste månaden på 14°C till 22°C den varmaste. Den relativa fuktigheten i utbredningsområdet är hög, och varierar mellan 60% dagtid och upp till 90% nattetid. När undertecknad besökte området år 2000 i April, låg temperaturen på morgonen vid 9-tiden på mellan 8 och 10°C. Vartefter solen kom upp steg temperaturen snabbt till 28°C.

Utseende: Grundfärgen är mörkt grön, men varierar mot ljusgrönt med en blåaktig ton när djuret är i praktfärg. Ryggen är täckt med små röda prickar från nacken till svansroten. Från huvudets bakre del och längs nacken går ett rostrött streck. Tvärs över huvudet går två röda tvärbånd. Överläppen och ringen runt ögat är himmelsblå. Hakan är som namnet antyder citrongul. Svansen är något utplattad och ger ett lite bredare intryck. Som vuxen når den en storlek på maximalt 17 cm. och kan därmed räknas till de medelstora arterna. Honorna blir lite mindre och når sällan över 14 cm. Ungarna har samma färg som de vuxna djuren.

Skötsel: På grund av den fuktiga och kalla miljö där arten lever, så hör den inte till någon av de lättare arterna att hålla i terrarium. Den är även ännu så länge mycket ovanlig i terrariesammanhang, och bör överlåtas till personer med stor erfarenhet av känsligare *Phelsuma* arter. I de flesta fall så går det att hålla parvis, men om aggression uppträder mellan könen, så måste de separeras omedelbart. Hanarna kan om det går riktigt illa döda en hona som han inte anser passa.

Terrariet för ett par bör mäta 50X50X70, och ska inredas med mycket växter och gömmställen. Detta för att ge djuren en möjlighet att undkomma varandra, och växterna dessutom för att uppehålla den höga luftfuktighet som arten kräver. Temperaturen dagtid bör ej överstiga 29°C, och bör nattetid sänkas så långt som möjligt. Optimalt är en sänkning till 18°C, och vintertid ytterligare några grader. Den relativa fuktigheten ska kan få variera mellan 70-90%. Djuren måste duschas minst en gång per dag. Äggen limmas företrädesvis i bamburören och kläcks vid en temperatur på 28°C efter ca: 50 dagar. Ungarnas teckning liknar föräldrarnas och de mäter vid kläckning 38-42 mm. Dessa bör hållas en och en i små terrarier under uppväxten. Både ungar och vuxna djur gynnas starkt av att under sommarmånaderna hållas i utomhusterrarier av nät. Även hos denna art kläcker bara en mycket liten andel hanar i fångenskap.

