

Captive bred Phelsuma

Phelsuma guttata

Kaudern, 1922

1922 *Phelsuma guttata* Kaudern, Zool. Jb.

(Syst.), Jena, 45:418, Bild 12, Fig 1-1a.

1939 *Phelsuma guttatum* Rendahl, Zool.

Jb. (Syst.), Jena, 72:268

Typlokal: Fandrarazana, Nord Ost Madagascar.

Förekomst: *P. guttata* förekommer på Madagascars östkust från Toamasina (Tamatave) upp till Masoalahalvön samt på ön St. Marie (Nosy Boraha). Den lever frammför allt i den lägre vegetationen under större träd och palmer i låglandsregnskogen. På St. Marie kan den också påträffas bland mänsklig bebyggelse. Klimatet är väldigt fuktigt, med en årlig nederbörd på 3640 mm i snitt. Medeltemperaturen den varmaste månaden är 26°C, och den kallaste har en medeltemperatur på 21°C. Regnperioden med dagliga regn är under perioden November till Mars.

Utseende: *P. guttata* är väldigt slank till sin kroppsbyggnad och har en smalt spetsigt huvud. Totalt blir den ca: 13 cm, och honorna är bara obetydligt mindre. Grundfärgen är mörkt grön/blå. Ryggen har ett antal röda och svarta fläckar glest utspridda. Sidorna är marmorerade i gul/grått. Från nosen och genom ögat går ett rostfärgat (ibland svart) streck som fortsätter bakom ögat. Enstaka individer kan även ha en blåaktig nackfläck. Undersidan är gulvit. På nosen har den en roströd triangel. Ögats iris är orangefärgat. Även benen har samma gul/grå marmorering som sidorna. Ungdjuren ser ut som små kopior av de vuxna, men med en lite blekare framtoning.

Skötsel: Arten är ännu så länge relativt ovanlig inom terrariehobbyn, men börjar så smått att bli vanligare. Den är relativt anspråkslös att hålla, så länge som man kan erbjuda både en hög luftfuktighet, samt ett torrare ställe att sola på. Lämplig storlek på terrariet är 40X40X50, och arten hålls bäst parvis. Temperaturen dagtid bör nå upp till 30°C och kan nattetid få sjunka till 20°C. Fuktigheten ska som tidigare nämnts vara hög, och lämpligt är 80-90%.

Inredningen bör vara ganska tät med levande växter, och givetvis de obligatoriska bamburören(eller liknande). Arten lägger normalt ca: 6-7 dubbelägg per år. Äggen kan läggas dels i rören som hos övriga arter, men också ibland under blad och liknande på botten av terrariet. I en äggkläckare som håller en dagtemperatur av 30°C och med en nattsänkning till 24°C, kläcks äggen efter 42-48 dagar. Ungarna mäter då 38-42 mm.

Precis som hos övriga arter håller man ungarna bäst i separata terrarier. Under de första två månaderna är de ganska känsliga och kräver mycket regelbunden matning. Gärna varje dag. *P. guttata* når könsmogen ålder efter ca: 9 månader, men som hos många daggeckos bör paren inte introduceras för varandra förrän de nått 1.5-2 års ålder. Honor som paras för tidigt har en tendens att bli småväxta då productionen av ägg kostar på för mycket.

