

Captive bred Phelsuma

Phelsuma standingi

Methuen & Hewitt, 1913

1913 *Phelsuma standingi* Methuen
& Hewitt, Ann., Transvaal, Mus.,
Pretoria, 3 (4): 187.

Typlokal: Skogar vid floden Onilahy vid Maroamalona, Tongobory samt Andranilaho. Syd-väst Madagascar.

Förekomst: Torra skogar och busk-

savanner är det som kännetecknar artens utbredningsområde. Temperaturen i området är starkt varierande med högsta temperaturer upp mot 40°C. Årsmedeltemperaturen ligger på 23°C. Nattetid kan temperaturen sjunka så långt ner som mot 10°C. Nederbörden per år ligger runt 340 mm. Det är inte heller ovanligt med helt regnfria år. Anmärkningsvärt är att den relativa luftfuktigheten trots detta är relativt hög. Normalt så varierar den mellan 60-80%. Växtligheten i området består till stor del av endemiska succulenter. *P.standingi* påträffas också ofta på och i mänskliga byggnader. Andra förekommande arter i området är, *P.mod.leiogaster* och *P.mutabilis*.

Utseende: *P.standingi* hör till de stora arterna inom släktet, med sina 27 cm. Den är också kraftigt byggd. Färgmässigt så varierar den stort från individ till individ. Grundfärgen på de vuxna djuren är grå. Huvudet är grönt med bruna ornamenteringar. Ryggens ovansida är även den på vissa djur grön med bruna oregelbundna tvärband, men på andra helt grå. Svansen är oftast metalliskt blå. Vid topputfärgning kan hela kroppen få ett mer eller mindre tydligt blåskimmer. Undersidan är ljusgrå. Ögonringen är klart gulgrön. Ungdjuren skiljer sig väsentligt från de vuxna i sin teckning. Huvudet på juveniler har en klart gul grundfärg med kontrastrika bruna nätmönster. Kroppen är brun/grå med markanta klartblå tvärband, som börjar vid nacken och fortsätter längs hela kroppen, och längs hela svansen. Banden kan även bitvis vara rödskimmrande.

