

Captive bred Phelsuma

Phelsuma v-nigra comorograndensis

Meier 1986

1986 *Phelsuma v-nigra comorograndensis*
Meier, Salamandra, Bonn, 22(1): 17, Abb.4.

Typlokal: Nioumazaha, Grand Comoro.



Förekomst. Endemisk för Grand Comoro och förekommer där endast i närheten av typlokalen. På övriga delar av ön förekommer korsningar med nominatformen som är introducerad på ön.(Meier). Levnadssättet är lika som för *P.vn.v-nigra*.

Utseende. Grundfärgen är grön med ett utbredd blått skimmer som sträcker sig från nacken, längs hela ryggen och svansen. Ryggen är täckt av ett större antal små röda fläckar. Från de två rödaktiga tvärbanden på huvudet och bak längs rygglinjen går en hel eller delvis bruten röd längslinje. Längs sidan framträder en gråbrun sidolinje. Undersidan är gulvit.

Skötsel. Har först de senaste året importerats, och spridits i terrariesammanhang, vilket gör uppgifterna lite knapphändiga. Temperaturen bör ligga mellan 28-30 gr. C. dagtid, och kan under natten få sjunka till rumstemperatur. Fuktigheten bör ligga runt 75 %. Man kan hålla en hane och flera honor i samma terrarium, förutsatt att det finns tillräckligt med gömställen för alla djur. Alla djuren ska också ha möjlighet att etablera egna revir. Ett lämpligt terrarium bör mäta 50X50X80 cm för en mindre grupp. Terrariet bör också vara välplanterat. Precis som hos *P.vn. pasteuri* så använder ofta alla honor samma ställe för att lägga ägg. Vid en temperatur på mellan 26-31 gr. C kläcks ungarna efter 40-50 dagar.

Phelsuma v-nigra anjouanensis Meier 1986

1986 *Phelsuma v-nigra anjouanensis* Meier, Salamandra,
Bonn, 22 (1): 15, Abb.3.

Typlokal: Mutsamudu, Anjouan.

Förekomst. Endemisk för ön Anjouan på Comorererna. Förekommer i täta populationer och i många skiftande habitat såsom, kokospalmer, bananplantor, agave, och buskterräng. Den förekommer även på marken längs kustlinjen.

Utseende. Översidan är klargrön och täckt med ett stort antal mycket små röda fläckar, som nästan bildar ett nättliknande mönster. På nacken förekommer endast ett fåtal fläckar. På huvudet finns två röda tvärband. På undersidan är hakan och bröstpartiet vitgrått, och längre bakåt övergår färgen till gröngrått. Som vuxen når den en total-längd av 110 mm.

Skötsel. Få uppgifter finns, men enligt McKeown (1993, The General Care and Maintenance of Day Geckos) föredrar den här underarten lite torrare klimat. Annars som övriga underarter. Så vitt undertecknad vet så förekommer den ej i Europeiska eller Amerikanska samlingar.

Phelsuma v-nigra spec. 2001

Exporterades våren 2000 från Comorererna via Madagascaren till stora delar av världen som en ännu ej beskriven art. Troligtvis så rör det sig om en korsning mellan nominatformen *P.vn.v-nigra* och *P.vn.comorograndensis*. Självklart så bör dessa individer hållas separat för att inte ytterligare korsa underarterna tills närmare beskrivning gjorts.